


БЕЗОПАСНАЯ ПРАКТИКА ПРИ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ). ПРОФИЛАКТИКА НППИ.



Докладчик: руководитель отдела
эпидемиологического контроля и
надзора Темиртауского городского
Управления санитарно-
эпидемиологического контроля Ким
Людмила Николаевна

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- ▶ Согласно внесению изменений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612 Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам (с изменениями от 20 февраля 2024 г. № 102) в Национальный календарь профилактических прививок Республики Казахстан включена вакцинации против вируса папилломы человека девочек 11-ти лет в 2-х дозовом режиме

**ПРОВЕДЕНИЕ ВПЧ ВАКЦИНАЦИИ
ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
РШМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
НА 74,2%**

БЕЗОПАСНАЯ ПРАКТИКА ИММУНИЗАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НАСЕЛЕНИЮ

- ПРИВИВКИ ПРОВОДЯТСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВИВОК ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ОФОРМЛЯЕТСЯ В БУМАЖНОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 К НАСТОЯЩИМ САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ.
- ПРИ ОТКАЗЕ ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ОФОРМЛЯЕТСЯ ОТКАЗ ОТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В БУМАЖНОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 3 К НАСТОЯЩИМ САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ. ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ИЛИ ОТКАЗ ВНОСЯТСЯ В МИС

Приложение 2
к Санитарным правилам
"Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
и проведению профилактических
прививок населению"
форма

Информированное согласие на проведение профилактических прививок

я _____
(ФИО (при его наличии) прививаемого лица или родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего)
Дал согласие на получение профилактической прививки:

_____ (наименование вакцины или других иммунологических лекарственных препаратов
(иммунологических лекарственных препаратов))

_____ (ФИО (при его наличии), дата рождения лица, которому вводится вакцина
или другие иммунологические лекарственные препараты
(иммунологические лекарственные препараты))
и подтверждаю, что проинформирован (а) о важности проведения
профилактической прививки, возможных реакции и неблагоприятных
последствиях на вакцину, необходимости своевременного обращения
в организацию здравоохранения при развитии любых неблагоприятных
последствий после иммунизации, вызывающих беспокойство,
и такое о последствии отказа от профилактических прививок.
Дата "____" _____ 20__ года
Подпись _____

Приложение 3
к Санитарным правилам
"Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
и проведению профилактических
прививок населению"
форма

Информированный отказ от проведения профилактических прививок

я _____
(ФИО (при его наличии) прививаемого лица или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего)
Отказываюсь от получения профилактической прививки:

_____ (наименование вакцины или других иммунологических лекарственных препаратов
(иммунологических лекарственных препаратов))

_____ (ФИО, дата рождения лица, которому рекомендована вакцина или другие
иммунологические лекарственные препараты
(иммунологические лекарственные препараты))
и подтверждаю, что проинформирован (а) о важности проведения профилактической
прививки и последствиях отказа от профилактических прививок.

Причины отказа (отметить):

- 1) религиозные;
 - 2) личные убеждения;
 - 3) негативная информация в средствах массовой информации,
социальных сетях и других интернет-ресурсах;
 - 4) токсичная реакция на предыдущую дозу вакцины или другие иммунологические
лекарственные препараты (иммунологические лекарственные препараты);
 - 5) другие (указать) _____.
- Дата "____" _____ 20__ года
Подпись _____
(прививаемого лица или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НАСЕЛЕНИЮ

Согласно Санитарных правил Приказ № 150 от 21
сентября 2023 года

- ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ (ПП) ВОП/ТЕРАПЕВТ ИЛИ ПЕДИАТР, ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЧА – ФЕЛЬДШЕР:
 - СБОР АНАМНЕЗА, МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА С ТЕРМОМЕТРИЕЙ,
 - ДОПУСК К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ В МЕДИЦИНСКОМ ДОКУМЕНТЕ,
 - ДАЛЕЕ – МИС,
 - ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРИВИВАЕМОМУ ЛИЦУ /ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКЕ, ВОЗМОЖНЫХ РЕАКЦИЯХ И НППИ, ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТКАЗА ОТ ПРИВИВКИ.
- РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ВРЕМЕННОМ ИЛИ ПОСТОЯННОМ МЕДИЦИНСКОМ ПРОТИВПОКАЗАНИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПП НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИНИМАЕТ ВОП/ТЕРАПЕВТ ИЛИ ПЕДИАТР (ФЕЛЬДШЕР).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НАСЕЛЕНИЮ

Приложение
к Санитарным правилам
"Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
и проведению профилактических
прививок населению"

- **ОПРОС ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ ПРОВОДИТСЯ ПО ВОПРОСНИКУ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ОПРОСУ ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА ИЛИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ, ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ГРАЖДАН, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РК ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 4 К НАСТОЯЩИМ САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ.**

Вопросник для медицинских работников по опросу прививаемого лица или его родителей, или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан перед проведением профилактической прививки

Категории	Вопросы	Да и (или) нет
Обязательные вопросы	Общее состояние прививаемого лица (ребенка)? Наличие острого заболевания?	
	Наличие аллергии на какие-либо лекарства, продукты питания или вакцины?	
	Были ли серьезные реакции на введение какой-либо вакцины в прошлом?	
	Наблюдались ли судороги или патологии головного мозга и нервной системы?	
	Состоит ли прививаемое лицо (ребенок) на диспансерном учете?	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ВАКЦИНАЦИИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВАКЦИН

№ КР ДСМ-146/2020

ОБЩИЕ ПОСТОЯННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (АБСОЛЮТНЫЕ)

✓ СИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ, В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ВВЕДЕНИЯ ДАННОЙ ВАКЦИНЫ (ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 40° ВЫШЕ, СУДОРОГИ, ГИПОТОНИЧЕСКИ-ГИПОРЕАКТИВНЫЙ СИНДРОМ)

✓ ТЯЖЕЛАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ АНАФИЛАКСИЯ) ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ ИЛИ НА ЛЮБОЙ ИЗ КОМПОНЕНТОВ ВАКЦИНЫ.

• ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ)

- 1) ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ (МЕНИНГИТ, ЭНЦЕФАЛИТ, МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ) – ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА СРОК ДО ОДНОГО МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ;
- 2) ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ – ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ, НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ – ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРТИКОСТЕРОИДАМИ;
- 3) ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ - ВАКЦИНАЦИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2-4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ;
- 4) ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРОИДОВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ИММУНОСУПРЕССИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ
- 5) ОБОСТРЕНИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ - ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ И ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД СТОЙКОЙ РЕМИССИИ;
- 6) ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ИЛИ НЕСТАБИЛЬНЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ СУДОРОГИ ИЛИ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ – ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПОЛНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ.

ИМЕЮТСЯ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ?

ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ НЕ РЕКОМЕНДОВАНА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

АЛЛЕРГИЯ



БЕРЕМЕННОСТЬ



ЛИХОРАДКА




НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ, НАПРИМЕР ПРОСТУДА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВАКЦИНАЦИИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ВПЧ-ВАКЦИНЫ

1. ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ **ОТ 2 ДО 8 °С.**
2. ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ЗАМОРАЖИВАНИЮ.
3. ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К СВЕТУ.

ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ И ТЕРМОСУМКИ



ПОБОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ (НППИ): КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ПРИЧИНАМ

1
**РЕАКЦИИ,
ОБУСЛОВЛЕННЫ
Е ДЕЙСТВИЕМ
ВАКЦИННОГО
ПРЕПАРАТА.**

НППИ, вызванное или спровоцированное вакциной, обусловленное одним или несколькими свойствами, характерными для вакцинного препарата

2
**РЕАКЦИИ,
ОБУСЛОВЛЕННЫ
Е ДЕФЕКТАМИ
КАЧЕСТВА
ВАКЦИНЫ**

3
**РЕАКЦИИ,
ОБУСЛОВЛЕННЫ
Е
ПРОЦЕДУРНЫМИ
ОШИБКАМИ
ИММУНИЗАЦИИ**

4
**РЕАКЦИИ,
СВЯЗАННЫЕ С
БЕСПОКОЙСТВОМ
ПО ПОВОДУ
ИММУНИЗАЦИИ**

5
**СЛУЧАЙНОЕ
СОВПАДЕНИЕ**

КЛАССИФИКАЦИЯ НППИ



РЕАКЦИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДЕЙСТВИЕМ ВАКЦИННОГО ПРЕПАРАТА

НППИ, вызванное или провоцируемое вакциной в связи с одним или более свойств, присущих этому вакцинному препарату

• ПРИМЕР: ОБШИРНЫЙ ОТЕК КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ АКДС



РЕАКЦИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ НЕАДЛЕЖАЩИМ КАЧЕСТВОМ ВАКЦИНЫ

• НППИ, вызванное или провоцируемое вакциной вследствие одного или более дефектов качества вакцинного препарата, включая повреждение устройства доставки вакцины, поставленного тем же производителем.

• ПРИМЕР: НЕПОЛНАЯ ИНАКТИВАЦИЯ СЕРИИ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ СЛУЧАЕВ ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ПОЛИОМИЕЛИТА



РЕАКЦИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ОШИБКОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ

• НППИ, вызванное ненадлежащим обращением с вакциной, нетравильным ее назначением или введением, что, по своей природе, предотвратимо.

• ПРИМЕР: ПЕРЕДАЧА КАКОЙ-ЛИБО ИНФЕКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНТАМИНИРОВАННОГО МНОГОДОЗОВОГО ФЛАКОНА



РЕАКЦИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ БОЯЗНЬЮ ВАКЦИНАЦИИ

НППИ, вызванное тревожным состоянием в связи с вакцинацией.

ПРИМЕР: ВОЗАГАЛЬНЫЙ ОБМОРОК У ПОДРОСТКА ВО ВРЕМЯ/ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ



СЛУЧАЙНОЕ СОБЫТИЕ

НППИ, вызванное факторами, отличными от следующих: качество вакцинного препарата, ошибки при иммунизации или боязнь вакцинации

ПРИМЕР: ВО ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ РАЗВИВАЕТСЯ ЛИХОРАДКА (ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ), КОТОРАЯ, В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАНА МАЛЯРИЕЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ



- ✓ ВАКЦИНИРОВАТЬ ПАЦИЕНТОВ ПО ОДНОМУ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОМ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ПОМЕЩЕНИИ.
- ✓ ВО ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ (ИЛИ ДАЖЕ ЛЕЖА).
- ✓ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ.
- ✓ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХОГЕННОЙ РЕАКЦИИ НА БОЯЗНЬ «УКОЛА» ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВИВОЧНОЙ КОМПАНИИ В ШКОЛАХ, ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ ПРИНЦИП «СКВОЗНОГО КОРИДОРА»



ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ **НППИ** ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВПЧ-ВАКЦИНЕ



ВПЧ-ВАКЦИНА БЕЗОПАСНА, НО МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ

- ПОКРАСНЕНИЕ, БОЛЬ ИЛИ ОТЕК В МЕСТЕ ИНЪЕКЦИИ

- СИНКОПЕ (ОБМОРОК)

- В КРАЙНЕ РЕДКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АНАФИЛАКСИЮ.



ПАЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ



РЕАГИРОВАНИЕ НА ЛЮБЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ И ИХ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ОТЧЕТНОСТИ

СТРАНЫ С НЕУДАЧНЫМ ОПЫТОМ ВАКЦИНАЦИИ

В ЯПОНИИ МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ВНЕДРИЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ВПЧ ДЛЯ ДЕВОЧЕК В 2010 ГОДУ, А ВАКЦИНА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ИММУНИЗАЦИИ В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА. ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОХВАТ СОСТАВЛЯЛ ОКОЛО 70%. ОДНАКО В ИЮНЕ 2013 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ ПРИОСТАНОВИЛО АКТИВНУЮ ПРОПАГАНДУ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ ПОСЛЕ НЕПОДТВЕРЖДЕННЫХ СООБЩЕНИЙ, ПОЯВИВШИХСЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, О ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ.

ЯПОНСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВАКЦИНАЦИИ И ДРУГИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНУЮ КАМПАНИЮ ЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ, УЧИТЫВАЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В ЯПОНИИ. В ИЮЛЕ 2017 ГОДА ВОЗ СООБЩИЛА, ЧТО УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В ЯПОНИИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3,4% С 1995 ПО 2005 ГОД И, КАК ОЖИДАЕТСЯ, ОН ПОВЫСИТСЯ НА 5,9% ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДАННЫХ ЗА ПЕРИОД С 2005 ПО 2015 ГОД.

РУМЫНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ ПРИМЕРОМ НЕУДАЧНОЙ ПРОГРАММЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ. РОДИТЕЛИ В РУМЫНИИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВАКЦИН ПРОТИВ ВПЧ ИЗ-ЗА НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. И ТОЛЬКО В 2020 ГОДУ КАМПАНИЯ БЫЛА ВОЗОБНОВЛЕНА.


ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ ПРОИЗОШЛА И У НАС В СТРАНЕ В 2013 ГОДУ ИЗ-ЗА НЕГАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В СМИ, ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ БЫЛА ПРИОСТАНОВЛЕНА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОПЫТ СТРАН ПОКАЗЫВАЕТ ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ О БЕЗОПАСНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ НЕ ТОЛЬКО СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ КАК ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ НО И СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ВАКЦИНАЦИИ В 4-Х РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

В 2013 ГОДУ НАЧАТА ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ (3 ДОЗЫ) В 4-Х РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА (АТЫРАУСКАЯ, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТИ, ГГ АЛМАТЫ И АСТАНА)



ВАКЦИНАЦИЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА С СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛАХ. НА ВЫБОР ПРЕДЛАГАЛИСЬ 2 ВАКЦИНЫ «ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ» И «ДВУХВАЛЕНТНАЯ». ГАРДАСИЛ ПРИМЕНЕН В 62%, ДВУХВАЛЕНТНАЯ – 37%



17 295 ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ ПОЛУЧИЛИ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РШМ



2 ДОЗЫ ПОЛУЧИЛИ 11 648 В ВОЗРАСТЕ ОТ 11 ДО 26 ЛЕТ

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ПРИ ОБЩЕНИИ С РОДИТЕЛЯМИ



Готовность родителей вакцинировать своего ребенка вакциной против ВПЧ

Да
29%

Не уверен(а)
36%

Нет
35%



ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:

ЧЕК-ЛИСТ:

- ИЗЛОЖЕНА ДОСТУПНЫМ ЯЗЫКОМ
- АДАПТИРОВАНА К ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
- НЕАНГАЖИРОВАННАЯ (НЕПРЕДВЗЯТАЯ)
- ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ДАННЫХ И ФАКТАХ, НЕ МНЕНИЯХ
- ССЫЛАТЬСЯ НА ИСТОЧНИКИ

ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ:

- ЭФФЕКТИВНА ЛИ ВАКЦИНА?
- БЕЗОПАСНА ЛИ ВАКЦИНА?
- ПОЧЕМУ ВАКЦИНА ВАЖНА?
- ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ДОВЕРЯТЬ ВРАЧАМ/ПОЛИКЛИНИКЕ/МЕДСЕСТРЕ?




ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА СНИЖАЕТ ОХВАТ ВАКЦИНАЦИЕЙ НА 23 %



РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ ДЕВУШЕК Г.АЛМАТЫ

**НЕТ СВЯЗИ МЕЖДУ ВАКЦИНАЦИЕЙ
ПРОТИВ ВПЧ И БЕСПЛОДИЕМ**



**ИСТОРИЯ ВАКЦИНИРОВАННОЙ ДЕВУШКИ... получила ВПЧ
ВАКЦИНУ В 12 ЛЕТ СЕЙЧАС МНЕ 22 ГОДА.
ЗАКОНЧИЛА КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦЕВТА. ЗАМУЖ ВЫШЛА 2020 Г.
РОДИЛА МАЛЬЧИКА 06.07.2021 Г ВЕС -4150 КГ РОСТ-57 СМ**



Federico Martinon

@fedemartinon



**ЕСЛИ ВАШ ВРАЧ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ
ПРОТИВ ВПЧ, БЫСТРЕЕ БЕГИТЕ ОТ НЕГО!! ОН И ПО ДРУГИМ
ВОПРОСАМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ В ТЕМЕ!**

#eurogin2013 #wacc #hpv

ГЛАВА ОТДЕЛЕНИЯ ПЕДИАТРИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В САНТЬЯГО (ИСПАНИЯ) ДОКТОР ФЕДЕРИКО МАРТИНОН ТОРРЕС,
ПРОФЕССОР, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



**ПРЕДОТВРАТИМ
РАК ШЕЙКИ МАТКИ**
ЗДОРОВЬЕ ДОЧЕРЕЙ В НАШИХ РУКАХ